



Culture	Maladie	Stade de la culture (CD)	Echantillon	Seuil d'intervention	Remarque
<b>Blé</b>	Piétin échaudage	31 - 32		Aucun	
	Helminthosporiose				
	Piétin verse	30 - 32	40 tiges	6 à 8 tiges atteintes (15 - 20 %)	Voir FT 2.55
	Oïdium	31 - 61	120 feuilles de 40 tiges	30 à 60 feuilles atteintes (25 - 50 %)	
	Rhizoctone			Aucun	
	Rouille brune	37 - 61	120 feuilles de 40 tiges	Variétés sensibles : 1 - 5 % feuilles atteintes Variétés moins sensibles : > 10 % feuilles atteintes	
	Rouille jaune	31 - 61	120 feuilles de 40 tiges (sans feuille F4)	3 à 5 feuilles atteintes (3 - 5 %)	Si attaques localisées pendant la montaison, intervenir rapidement.
	Septorioses sur feuilles	37 - 51	100 feuilles	20 feuilles atteintes (20 %)	Ne compter que la 4 <sup>e</sup> feuille définitive depuis le haut.
	Septoriose épi	51 - 61		Aucun	Attaque en région à risque et sur variétés sensibles. Traitement uniquement en préventif.
	Fusariose de l'épi	55 - 69		Aucun	Voir FT 2.56
<b>Orge</b>	Grillures	39 - 51		Dès les 1 <sup>ers</sup> symptômes sur les 3 dernières feuilles	
	Oïdium	30 - 51	120 feuilles de 40 tiges	30 à 60 feuilles atteintes (25 - 50 %)	
	Helminthosporiose	30 - 51	120 feuilles de 40 tiges	20 à 30 feuilles atteintes (15 - 25 %)	Cumul avec Rhyncho
	Rhynchosporiose	30 - 51	120 feuilles de 40 tiges	20 à 30 feuilles atteintes (15 - 25 %)	Cumul avec Helminto
	Rouille naine	30 - 51	120 feuilles de 40 tiges	> 30 % feuilles atteintes	
	Mosaïques			Aucun	
	Grillures	39 - 51		Dès les 1 <sup>ers</sup> symptômes sur les 3 dernières feuilles	



Culture	Maladie	Stade de la culture (CD)	Echantillon	Seuil d'intervention	Remarque
<b>Triticale</b>	Oïdium	7	120 feuilles de 40 tiges	30 à 60 feuilles atteintes (25 - 50 %)	Seuil provisoire
	Rhynchosporiose	37 - 51	120 feuilles de 40 tiges	20 à 30 feuilles atteintes (15 - 25 %)	
	Rouille brune	37 - 61	120 feuilles de 40 tiges	Variétés sensibles : 1 - 5 % feuilles atteintes Variétés moins sensibles : > 10 % feuilles atteintes	
	Rouille jaune	31 - 61	120 feuilles de 40 tiges	3 à 5 feuilles atteintes (3 - 5 %)	Si attaques localisées pendant la montaison, intervenir rapidement.
	Septorioses sur feuilles	37 - 51	100 feuilles	20 feuilles atteintes (20 %)	Ne compter que la 4 <sup>e</sup> feuille définitive depuis le haut.
	Septoriose épi	51 - 61	120 feuilles de 40 tiges	Aucun	Attaque en région à risque et sur variétés sensibles. Traitement uniquement en préventif.
	Fusariose de l'épi	55 - 69		Voir FT 2.56	
<b>Seigle</b>	Rhynchosporiose	37 - 51	120 feuilles de 40 tiges	20 à 30 feuilles atteintes (15 - 25 %)	
	Rouille brune	37 - 61	120 feuilles de 40 tiges	Variétés sensibles : 1 - 5 % feuilles atteintes Variétés moins sensibles : > 10 % feuilles atteintes	
	Septorioses sur feuilles	39 - 45 37 - 51	100 feuilles	20 feuilles atteintes (20 %)	Ne compter que la 4 <sup>e</sup> feuille définitive depuis le haut.